



## Perigos de mau uso



### Animais domésticos

Cães, gatos e outros animais podem ingerir o produto diretamente ou consumir roedores envenenados, causando intoxicação grave e até morte. Use estações rateiras apropriadas.



### Predadores dos roedores

Aves de rapina (milhafre), ouriço-caixeiro, doninha, furão e outros predadores podem morrer ao consumir roedores envenenados.



### Uso de estações rateiras inapropriadas

A utilização de estações rateiras não apropriadas aumenta o risco de acesso a animais não-alvo e crianças.



### Impacto ambiental

O uso incorreto de rodenticidas contamina o solo, a água e outros organismos. Por isso evite a disposição a vulso.

## Em caso de intoxicação:



Contactar imediatamente: 112

Centro de Informação  
Antivenenos: 800 250 250

Se for ao hospital leve uma embalagem do rodenticida utilizado.



## IMPORTANTE!

A utilização de rodenticidas deve ser sempre complementar a medidas de prevenção e controlo ambiental.

Por isso contribua com a manutenção dos espaços habitacionais e urbanos limpos!



### PREVENIR

Reduzir pontos de alimentação, abrigo e entrada.



### CONTROLAR

Aplicar métodos adequados, com segurança e precisão.



### MONITORIZAR

Conhecer a situação real para agir com eficácia.



### AVALIAR

Analisar e corrigir o que for necessário



## RODENTICIDA

### INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO



## O que é um rodenticida?

Um rodenticida é um produto utilizado no controlo de murganhos, ratos e ratazanas em ambientes urbanos, agrícolas e industriais. Apresenta-se geralmente sob a forma de grão ou de outros tipos de isco, especialmente atrativos para os roedores. Após a ingestão, a substância ativa atua no organismo do animal, provocando a sua morte.

## Como atuam?

Os rodenticidas contêm, geralmente, substâncias anticoagulantes que, após a ingestão, interferem com o processo de coagulação do sangue, provocando hemorragias internas que podem levar à morte do roedor.

O seu efeito não é imediato, manifestando-se algum tempo após a ingestão. Esta ação retardada dificulta a associação entre o consumo do isco e os seus efeitos, reduzindo a desconfiança e a rejeição do isco pelos restantes roedores da colónia.

## Como deve ser guardado?



Conservar na embalagem original, bem fechada.



Guardar em local seco, fresco e ventilado.



Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Não armazenar junto de alimentos ou rações.

## Doses recomendadas: (uso urbano e rural)

### Murganho (*Mus musculus*)

Colocar 1 saqueta por estação rateira. Se utilizar várias estações rateiras, coloque-as a 1 a 2 metros de distância entre si.



### Rato de Quinta ou Ratazana Preta (*Rattus rattus*)

Colocar 1 a 2 saquetas por estação rateira. Se utilizar várias estações rateiras, coloque-as a 4 a 5 metros de distância entre si.



### Ratazana do Esgoto ou Ratazana Castanha (*Rattus norvegicus*)

Colocar 3 a 4 saquetas por estação rateira. Se utilizar várias estações rateiras, coloque-as a 4 a 5 metros de distância entre si.



## Como deve ser aplicado?



Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.



Utilizar luvas durante o manuseamento.



Afixar as estações rateiras junto a locais de passagem dos roedores (paredes e zonas abrigas).



Colocar o produto em estações rateiras devidamente homologadas para o efeito.



Não espalhar o rodenticida diretamente no chão.



Após a aplicação do produto nas estações rateiras verificar a cada 3/7 dias e repor se necessário.



Manter o tratamento até não haver mais consumos.



Lavar bem as mãos após o seu manuseamento.

## Como os podemos evitar?

Restos de alimentos e água em locais públicos.

Contentores de lixo mal fechados.

Rações de animais domésticos. Esgotos e acumulação de matéria orgânica

A disponibilidade de alimento é um dos fatores que favorecem a presença de ratos.